

## SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

### PROCESSIONARIA DEL PINO - SCHEMA TECNICA DI DIFESA INTEGRATA

Metodi di Lotta	Sostanza Attiva	Periodo di intervento	Note
1. Fisico-meccanici (asportazione dei nidi, lotta balistica)		tardo autunno – inizio dell'inverno (prima dell'apertura dei nidi invernali)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimozione dei nidi prima che l'innalzamento termico faccia uscire le larve.</li> <li>Per piante isolate è possibile applicare cartoni collati intorno al tronco tra febbraio e marzo al fine di catturare le larve che scendono dalla chioma.</li> <li>La lotta balistica viene effettuata sparando contro i nidi invernali; ha un'efficacia ridotta rispetto all'asportazione dei nidi e richiede un'autorizzazione da parte delle autorità competenti.</li> </ul>
2. Biotecnici (trappole a feromoni)	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki o var. Aizawai	entro la prima decade di giugno	<ul style="list-style-type: none"> <li>In zone isolate, predisporre trappole a feromoni per la cattura massale lungo il perimetro ad una distanza di circa 100 mt. l'una dall'altra.</li> </ul>
3. Irrorazioni in piena chioma con prodotti biologici	Abamectina Imidacloprid	nel mese di settembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagnare bene ed uniformemente la chioma intervenendo nelle ore serali più fresche.</li> <li>In caso di pioggia o di forte infestazione ripetere il trattamento dopo 4-5 gg.</li> </ul>
4. Iniezioni al tronco (endoterapia)		seconda metà di agosto - settembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguire le indicazioni relative alla tecnica endoterapica scelta</li> </ul>